

РГР №7 Группа №110 Вариант №1

- 1) В магазин вошли 8 покупателей. Найти вероятность того, что 3 из них совершают покупки, если вероятность совершить покупку для каждого покупателя одна и та же - 0.2541.
- 2) Вероятность попадания при каждом выстреле = 0.8. Имеется три снаряда. Написать закон распределения случайной величины  $X$  - числа израсходованных снарядов, если стрельба ведётся до первого попадания в цель.
- 3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	15	16	17	18	19	20	21	22
$n_i$	3	9	17	20	16	13	7	2

РГР №7 Группа №110 Вариант №2

- 1) Средний процент нарушения работы кинескопа телевизора в течение гарантийного срока 10%. Вычислить вероятность того, что из двадцати наблюдавших телевизоров более 18 выдержат гарантийный срок.
- 2) Рабочий за смену изготавливает 300 деталей. Вероятность того, что деталь будет 1 сорта равна 0.75. Какова вероятность, что деталей 1 сорта будет менее 200?
- 3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	8	10	12	14	16	18	20	22
$n_i$	3	8	11	15	14	12	9	2

РГР №7 Группа №110 Вариант №3

- 1) Студента допускают к экзамену по математике, если он защитит РГР. Вероятность защитить РГР - 0.7, а сдать экзамен - 0.5 (если допускают). Какова вероятность того, что студент не сдаст экзамен?
- 2) Случайные ошибки измерения распределены нормально с параметрами  $(0; 0.5)$ . Найти вероятность того, что при двух независимых измерениях ошибка хотя бы один раз будет по абсолютной величине больше 1.
- 3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	7	11	15	19	23	27	31	36
$n_i$	3	10	11	17	13	10	7	2

РГР №7 Группа №110 Вариант №4

- 1) По танку производится два одиночных выстрела. Вероятность попадания при первом - 0.5, при втором - 0.8. Для вывода танка из строя заведомо достаточно двух попаданий. При одном попадании танк выходит из строя с вероятностью 0.4. Найти вероятность того, что в результате двух выстрелов танк будет выведен из строя.
- 2) Найти математическое ожидание и дисперсию числа появлений события А в трех независимых испытаниях, если в одном испытании событие А происходит с вероятностью 0.4.
- 3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	15	17	19	21	23	25	27	29
$n_i$	3	7	10	17	20	15	6	1

РГР №7 Группа №110 Вариант №5

- 1) Вероятность ясного дня в июле в Подмосковье равна  $\frac{25}{31}$ . Найти вероятность того, что первые два дня июля будут ясными.
- 2) Пусть вес пойманной рыбы подчиняется нормальному закону с параметрами (375грн.; 25грн.). Найти вероятность того, что вес одной пойманной рыбы будет от 300грн. до 425грн.
- 3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	6	8	10	12	14	16	18	20
$n_i$	2	7	9	15	8	6	4	1

РГР №7 Группа №110 Вариант №6

- 1) Из колоды в 52 карты вынимаются наудачу три карты. Найти вероятность того, что эта тройка, семёрка, туз.
- 2) Автомат изготавливает шарики. Шарик считается годным, если отклонение  $X$  диаметра шарика от проектного размера по абсолютной величине меньше 0.7мм. Считая, что случайная величина  $X$  распределена нормально  $N(0; 0.4)$ , найти среднее число годных шариков среди 100 изготовленных.
- 3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	10	12	14	16	18	20	22	24
$n_i$	6	7	10	13	9	8	5	4

РГР №7 Группа №110 Вариант №7

1) Имеются три урны, причем 1-ая содержит 1 белый и 6 чёрных шаров, 2-ая - 3 белых и 2 чёрных, 3-ья - 7 белых и 8 чёрных шаров. Из одной урны, наудачу выбранной, вынут шар. Он оказался белым. Чему равна вероятность того, что шар вынут из первой урны?

2) Считается, что отклонение длины изготавляемых деталей от стандарта является случайной величиной, распределенной по нормальному закону. Если стандартная длина равна 40 см, и среднее квадратичное отклонение 0.4 см, то какую точность длины можно гарантировать с вероятностью 0.8?

3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	15	18	21	24	27	30	33	36
$n_i$	9	11	15	20	27	19	16	6

РГР №7 Группа №110 Вариант №8

1) Из 60 вопросов, вошедших в экзаменационные билеты, студент знает 50. На экзамене студенту задали 3 вопроса. Чтобы сдать экзамен ему достаточно ответить на 3 вопроса. Какова вероятность успешной сдачи экзамена?

2) Случайная величина  $X$  распределена нормально с параметрами  $(10, 4)$ . Найти величину  $a$ , при которой в результате испытания величина  $X$  попадает в интервал  $(10 - , 10 +)$  с вероятностью 0.9973.

3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	15	18	21	24	27	30	33	36
$n_i$	9	11	15	20	27	19	16	6

РГР №7 Группа №110 Вариант №9

1) На столе лежат 36 экзаменационных билетов с номерами  $1, 2, \dots, 36$ . Преподаватель берёт 3 любых билета. Какова вероятность того, что они из первых четырёх?

2) Стрелок производит по мишени три выстрела. Вероятность попадания в мишень при каждом выстреле равна 0.3. Определить закон распределения случайной величины  $X$  - числа попадания в мишень при трех выстрелах.

3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	14	17	20	23	26	29	32	35
$n_i$	7	10	13	18	12	11	9	5

РГР №7 Группа №110 Вариант №10

1) Наборщик пользуется двумя кассами. В первой кассе - 90%, а во второй - 80% отличного шрифта. Найти вероятность того, что извлечённая литера из наудачу взятой кассы будет отличного качества.

2) Случайная величина  $X$  распределена нормально с параметрами  $(0, 40)$ . Найти вероятность того, что значения величины  $X$  в одном испытании отклоняется от среднего значения по абсолютной величине не более чем на 20.

3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	16	18	20	22	24	26	28	30
$n_i$	7	10	11	17	13	9	8	5

РГР №7 Группа №110 Вариант №11

1) Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен равна 0.9, второй - 0.7, третий - 0.8. Вычислить вероятность того, что хотя бы два экзамена будут сданы.

2) Стрельба ведется из точки О вдоль прямой ОХ. Дальность полета снаряда  $X$  распределается с отклонением, равным 80м. Найти какой процент выпускаемых снарядов даст перелет от 120 до 160 м. Средняя дальность полета выпускаемых снарядов равна  $m$  метров.

3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	7	13	19	25	31	37	43	49
$n_i$	4	7	9	15	10	8	2	1

РГР №7 Группа №110 Вариант №12

1) Какова вероятность того, что два носка, взятые наудачу из ящика, содержащего 6 красных и 3 синих носка, будут одного цвета?

2) Стрелок производит по мишени три выстрела. Вероятность попадания в мишень при каждом выстреле равна 0.3. Определить закон распределения случайной величины  $X$  - числа попадания в мишень при трех выстрелах.

3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	14	17	20	23	26	29	32	35
$n_i$	7	10	13	18	12	11	9	5

РГР №7 Группа №110 Вариант №13

1) По танку производится два одиночных выстрела. Вероятность попадания при первом - 0.5, при втором - 0.8. Для вывода танка из строя заведомо достаточно двух попаданий. При одном попадании танк выходит из строя с вероятностью 0.4. Найти вероятность того, что в результате двух выстрелов танк будет выведен из строя.

2) Длина изготавляемой автоматом детали - случайная величина, распределённая нормально с параметрами (15см; 0.2см). Найти процент брака, если допустимые размеры детали 15( $\pm 0.3$ ).

3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	13	15	17	19	21	23	25	27
$n_i$	10	12	13	19	15	11	10	3

РГР №7 Группа №110 Вариант №14

1) На сборку поступают детали с трёх автоматов. Первый автомат даёт 0.3% брака, второй - 0.2%, третий - 0.4%. Найти вероятность попадания на сборку бракованной детали, если с первого автомата поступает 1000 деталей, со второго - 2000, а с третьего - 2500.

2) Случайная ошибка  $X$  измерения дальности до вехи (в метрах) имеет плотность вероятности

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{240}} e^{-\frac{(x+20)^2}{3200}}$$

. Определить вероятность того, что из трех независимых измерений ошибки хотя бы одного не превзойдет по абсолютной величине 30м.

3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	13	15	17	19	21	23	25	27
$n_i$	10	12	13	19	15	11	10	3

РГР №7 Группа №110 Вариант №15

1) В урне 3 шара: 1 белый 2 чёрных. Наудачу вынимают 5 раз один шар и каждый раз возвращают. Найти вероятность того, что белый шар вынули два раза.

2) Случайная величина  $X$  распределена нормально с параметрами (0, 4). Найти вероятность попадания величины  $X$  в интервал от 0 до 2 при одном испытании.

3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	7	10	13	16	19	22	25	28
$n_i$	6	11	14	19	16	10	7	4

РГР №7 Группа №110 Вариант №16

1) В цеху имеется 6 моторов. Для каждого мотора вероятность того, что он в данный момент включен, равна 0.8. Найти вероятность того, что в данный момент: а) включены 4 мотора; б) включены все моторы; в) выключены все моторы.

2) Вероятность появления события в каждом из 900 независимых испытаний равна 0.5. Найти вероятность того, что относительная частота появления события отклонится от его вероятности не более чем на 0.02.

3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	4	8	12	16	20	24	28	32
$n_i$	4	7	13	17	16	15	6	2

РГР №7 Группа №110 Вариант №17

1) Для поражения цели достаточно попадания хотя бы одного снаряда. Произведено два залпа из двух орудий. Найти вероятность поражения цели, если вероятность попадания в цель при одном выстреле из первого орудия равна 0.3, а из второго - 0.4.

2) Найти вероятность попадания в интервал (2; 13) нормально распределенной случайной величины  $X$ , если её математическое ожидание равно 10 и среднее квадратичное отклонение равно 4.

3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	9	13	17	21	25	29	33	37
$n_i$	7	10	14	27	21	15	12	6

РГР №7 Группа №110 Вариант №18

- 1) Бросили три монеты. Какова вероятность того, что герб выпадет только на двух монетах?
- 2) Рост мужчины -случайная величина, распределённая нормально с параметрами (170см; 6см).Найти вероятность того, что из трёх наудачу выбранных мужчин хотя бы один из будет выше 170см.
- 3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	5	9	13	17	21	25	29	33
$n_i$	6	8	14	20	19	7	5	3

РГР №7 Группа №110 Вариант №21

- 1) Имеются три урны, причем 1-ая содержит 1 белый и 6 чёрных шаров,2-ая - 3 белых и 2 чёрных, 3-ья - 7 белых и 8 чёрных шаров. Из одной урны, наудачу выбранной, вынут шар. Он оказался белым.Чему равна вероятность того, что шар вынут из первой урны?
- 2) Случайная величина  $X$  распределена нормально с параметрами (5, 3). Найти интервал, расположенный симметрично относительно математического ожидания, в который с вероятностью 0.9973 попадает  $X$  в результате испытания.
- 3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	5	10	15	20	25	30	35	40
$n_i$	7	11	15	23	19	17	8	3

РГР №7 Группа №110 Вариант №19

- 1) Контролёр из партии в 1000 изделий выбирает 50 штук. Найти вероятность того, что в выборке не окажется дефектных из- делий, если во всей партии их 4.
- 2) Случайная величина  $X$  распределена нормально с параметрами (1, 1). Найти вероятность того, что в первом испытании  $X$  окажется в интервале (0, 1), а во втором испытании  $X$  примет значение больше 1.
- 3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	10	13	16	19	22	25	28	31
$n_i$	2	4	8	10	17	7	5	4

РГР №7 Группа №110 Вариант №22

- 1) В первом ящике 7 белых шаров и 8 черных, во втором ящике 2 белых шара и 8 красных, в третьем ящике 4 белых шара и 1 зеленый. Из каждого ящика достают по одному шару. Найти вероятность того, что все они белые.
- 2) Найти  $M(X)$  и  $D(X)$ , если интегральная функция  $F(x)$  имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{если } x \leq 0 \\ \frac{x}{7} & \text{если } 0 < x \leq 7 \\ 1 & \text{если } x > 7 \end{cases}$$

РГР №7 Группа №110 Вариант №20

- 1) 80% изделий завода -продукция высшего сорта. Приобретено 6 изделий. Чему равна вероятность того, что 4 из них высшего сорта?
- 2) Случайные ошибки измерения подчинены нормальному закону  $N(0; 1)$  Найти вероятность того, что из двух независимых наблюдений ошибки хотя бы одного из них не превзойдет по абсолютной величине 1.28.
- 3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	5	8	11	14	17	20	23	26
$n_i$	4	6	10	19	17	11	9	3

- 3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	21	24	27	30	33	36	39	42
$n_i$	2	5	8	13	10	7	4	1

РГР №7 Группа №110 Вариант №23

- Наборщик пользуется двумя кассами. В первой кассе - 90%, а во второй - 80% отличного шрифта. Найти вероятность того, что извлечённая литерра из наудачу взятой кассы будет отличного качества.
- Случайная величина  $X$  распределена нормально с параметрами  $(0, 40)$ . Найти вероятность того, что значения величины  $X$  в одном испытании отклоняется от среднего значения по абсолютной величине не более чем на 20.
- Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	8	10	12	14	16	18	20	22
$n_i$	5	9	14	19	16	10	7	8

РГР №7 Группа №110 Вариант №26

- Вероятность поражения мишени при одном выстреле первым стрелком равна 0.8; а вторым - 0.9. Найти вероятность того, что оба стрелка поразят мишень.
- Стрельба ведется из точки О вдоль прямой ОХ. Дальность полета снаряда Х распределается с отклонением, равным 80м. Найти какой процент выпускаемых снарядов даст перелет от 120 до 160 м. Средняя дальность полета выпускаемых снарядов равна  $m$  метров.
- Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	9	13	17	21	25	29	33	37
$n_i$	3	7	10	15	9	4	2	1

РГР №7 Группа №110 Вариант №24

- Производится три выстрела по одной и той же мишени. Вероятности попадания при первом, втором и третьем выстрелах равны соответственно 0.4; 0.5; 0.7. Найти вероятность того, что после этих трёх выстрелов в мишени будет одна пробоина.
- В урне имеется 4 шара с номерами от 1 до 4. Вынули 2 шара. Случайная величина  $X$  - сумма номеров шаров. Построить закон распределения этой случайной величины.
- Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	10	12	14	16	18	20	22	24
$n_i$	8	14	17	25	22	13	10	6

РГР №7 Группа №110 Вариант №27

- Брошены две игральные кости. Какова вероятность выпадения двух различных граней?
- Найти вероятность того, что случайная величина распределенная по нормальному закону  $N(2; 5)$  примет значение меньше двух.
- Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	9	12	15	18	21	24	27	30
$n_i$	5	8	10	16	15	13	7	8

РГР №7 Группа №110 Вариант №28

- Два стрелка независимо один от другого стреляют по одной мишени, причём каждый из них делает по одному выстрелу. Вероятность попадания в мишень для первого стрелка - 0.8, для второго - 0.4. После стрельбы в мишени обнаружена пробоина. Найти вероятность того, что она принадлежит первому стрелку.
- Случайная величина  $X$  распределена нормально с параметрами  $(0, 1)$ . Найти вероятность того, что случайная величина окажется в интервале  $(0; \frac{1}{2})$ .
- Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	16	18	20	22	24	26	28	30
$n_i$	7	10	11	17	13	9	8	5

## РГР №7 Группа №110 Вариант №29

1) Производится три выстрела по одной и той же мишени. Вероятности попадания при первом, втором и третьем выстрелах равны соответственно 0.4; 0.5; 0.7. Найти вероятность того, что после этих трёх выстрелов в мишени будет одна пробоина.

2) Случайная величина  $X$  распределена нормально с параметрами  $(0, 1)$ . Найти вероятность того, что случайная величина окажется в интервале  $(0; \frac{1}{2})$ .

3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	6	9	12	15	18	21	24	27
$n_i$	5	7	10	17	19	15	11	4

## РГР №7 Группа №110 Вариант №32

1) Вероятность того, что в данный день торговая база уложится в норму расходов на транспорт, равна  $\frac{3}{4}$ . Какова вероятность того, что лишь в один из дней рабочей недели (6 дней) база уложится в норму?

2) Считается, что отклонение длины изготавляемых деталей от стандарта является случайной величиной, распределенной по нормальному закону. Если стандартная длина равна 40 см, и среднее квадратичное отклонение 0.4 см, то какую точность длины можно гарантировать с вероятностью 0.8?

3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	15	17	19	21	23	25	27	29
$n_i$	3	7	10	17	20	15	6	1

## РГР №7 Группа №110 Вариант №30

1) Что труднее: выиграть у равносильного противника 5 партий из 8 или 24 из 40?

2) Для нормально распределённой случайно величины  $X$ , имеющей  $(X) = 0$  и  $D(X) = 1$  определить вероятности:  $(X > 1)$  и  $(-1 < X < 1)$ .

3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	7	9	11	13	15	17	19	21
$n_i$	4	7	8	14	15	9	3	2

## РГР №7 Группа №110 Вариант №31

1) Монету бросают 10 раз. Найти вероятность того, что: а) герб выпадет 10 раз; б) после 9 появлений герба он выпадает и в десятый раз.

2) Найти  $M(X)$  и  $D(X)$ , если задан закон распределения  $X$ :

$x_i$	23	25	28	29
$p_i$	0.3	0.2	0.4	0.1

3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	8	12	16	20	24	28	32	36
$n_i$	5	10	11	17	15	8	6	3

## РГР №7 Группа №110 Вариант №33

1) На сборку поступают детали с трёх автоматов. Первый автомат даёт 0.3% брака, второй - 0.2%, третий - 0.4%. Найти вероятность попадания на сборку бракованной детали, если с первого автомата поступает 1000 деталей, со второго - 2000, а с третьего - 2500.

2) Найти вероятность того, что нормальная случайная величина с математическим ожиданием , равным 1 и дисперсией, равной 16, примет значение , не меньшее 0 и не большее 5.

3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	8	11	14	17	20	23	26	29
$n_i$	10	12	15	20	18	16	11	9

РГР №7 Группа №110 Вариант №34

- 1) Семья состоит из 3-х человек. Вероятности того, что муж, жена и ребенок заболеют во время эпидемии, равны соответственно 0.01, 0.008, 0.025. Если заболеет один из членов семьи, то заболевают все остальные члены семьи. Найти вероятность того, что во время эпидемии заболеют все члены этой семьи?
- 2) Случайная величина  $X$  распределена нормально с параметрами  $(0; 0,4)$ . Найти вероятность того, что отклонение случайной величины от её математического ожидания по абсолютной величине будет меньше 0.3.
- 3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	15	16	17	18	19	20	21	22
$n_i$	3	6	10	13	16	12	9	5

РГР №7 Группа №110 Вариант №35

- 1) Из партии, содержащей 5% брака взято на испытания 5 изделий. Какова вероятность что среди них: а) будет два бракованных? б) не будет ни одного бракованного?
- 2) Для нормально распределённой случайной величины найти вероятность того, что при двух независимых испытаниях отклонение от математического ожидания ни разу не превзойдёт среднего квадратичного отклонения.
- 3) Построить полигон отн. частот, эмп. функцию распределения, гистограмму отн. частот. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, исправленную дисперсию, выборочное с.к.о., исправленное с.к.о., моду, медиану, ср.абс. отклонение, коэффициент вариации.

$x_i$	4	9	14	19	24	29	34	39
$n_i$	1	4	7	20	15	10	6	2