Тема 2. Производная и ее приложения

Рассмотрим решение типичных задач по данной теме.

Пример 1. Найти производные функций указанного порядка.

а) $y = 3\text{ctgx} + \frac{e^x}{1-x}$, $y' = ?$

б) $y = \sin^3 x$, $y' = ?$, $y'' = ?$

Решение.

а) Применим правило дифференцирования суммы

$$(u+v)' = u' + v', \quad \text{тогда}$$

$$y' = \left(3\text{ctgx} + \frac{e^x}{1-x} \right)' = (3\text{ctgx})' + \left(\frac{e^x}{1-x} \right)'. \quad \text{При дифференци-$$

ровании первого слагаемого используем формулу:

$$(cf(x))' = c(f(x))', \quad \text{где } c \text{ - константа. Получим}$$

$$(3\text{ctgx})' = 3(\text{ctgx})' = 3\left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right)' = -\frac{3}{\sin^2 x}. \quad \text{Для второго сла-$$

гаемого применим формулу $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$. Получим

$$\left(\frac{e^x}{1-x}\right)' = \frac{(e^x)'(1-x) - (1-x)'e^x}{(1-x)^2} =$$

$$= \frac{e^x(1-x) - (-1)e^x}{(1-x)^2} = \frac{e^x(1-x+1)}{(1-x)^2} = \frac{e^x(2-x)}{(1-x)^2}. \quad \text{Итак, в ответе}$$

получим:

$$\left(3\operatorname{ctg}x + \frac{e^x}{1-x}\right)' = \frac{e^x(2-x)}{(1-x)^2} - \frac{3}{\sin^2 x}.$$

б) Замечая, что $y = \sin^3 x$ является сложной функцией $y = u^3$, где $u = \sin x$, применим правило дифференцирования сложной функции: $(y(u(x)))'_x = y'_u \cdot u'_x$. Получим: $y'_x = (u^3)'_u \cdot u'_x = 3u^2 \cdot (\sin x)'_x = 3\sin^2 x \cdot \cos x$. Итак, в ответе получим $y' = 3\sin^2 x \cos x$. Найдем y'' . Так как $y'' = (y')'$, то $y'' = (3\sin^2 x \cos x)' = 3(\sin^2 x \cdot \cos x)'$. Применим формулу для вычисления производной произведения: $(u \cdot v)' = u'v + v'u$, полагая $u = \sin^2 x$, а $v = \cos x$ получим: $(\sin^2 x \cdot \cos x)' = (\sin^2 x)' \cos x + (\cos x)' \sin^2 x$. Как и выше заметим, что функция $y = \sin^2 x$ сложная - $y = u^2$, $u = \sin x$, поэтому $(\sin^2 x)' = 2\sin x \cos x = \sin 2x$, а так как $(\cos x)' = -\sin x$, имеем $(\sin^2 x \cos x)' = \sin 2x \cos x + \sin^2 x \cdot (-\sin x) = \sin 2x \cos x - \sin^3 x$. Итак, в ответе получаем

$$(\sin^3 x)'' = 3(\sin 2x \cos x - \sin^3 x).$$

Пример 2. Найти дифференциал функции $y = (\cos x)^{\sin x}$.

Решение. Найдем сначала y' , так как $dy = y'dx$. Применим метод логарифмического дифференцирования, а именно: по правилу дифференцирования сложной функции $\ln y(x)$ имеем:

$(\ln y(x))' = \frac{y'}{y}$ или $y' = y \cdot (\ln(y(x)))'$. Значит для данной функции:

$$\begin{aligned} y' &= (\cos x)^{\sin x} (\ln(\cos x)^{\sin x})' = (\cos x)^{\sin x} (\sin x \cdot \ln \cos x)' = \\ &= (\cos x)^{\sin x} \left(\cos x \cdot \ln \cos x + \sin x \frac{-\sin x}{\cos x} \right) = \\ &= (\cos x)^{\sin x} \left(\cos x \cdot \ln \cos x - \frac{\sin^2 x}{\cos x} \right). \end{aligned}$$

Итак, в ответе получим

$$dy = d((\cos x)^{\sin x}) = ((\cos x)^{\sin x})' dx = (\cos x)^{\sin x} \left(\cos x \cdot \ln \cos x - \frac{\sin^2 x}{\cos x} \right) dx$$

Пример 3. Вычислить пределы, пользуясь правилом Лопиталя (см. I гл. IV §§ 4 - 5).

а) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x}$; б) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x}$; в) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$; г)

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\operatorname{tg} x}.$$

Решение.

а) Предел и числителя, и знаменателя равны 0, значит имеем неопределенность вида $\frac{0}{0}$. По правилу Лопиталя имеем:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)'}{(\sin^2 x)'} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \sin x \cos x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{2}.$$

б) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x}$, так как $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$, то имеем неопределенность вида $\infty \cdot 0$, так как $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, то можно преобразовать ее к виду

$\frac{\infty}{\infty}$, а затем применить правило Лопиталя. Так получаем:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0, \text{ так как } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

в) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$, так как $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$ и $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x - 1} = \infty$

$\left(\lim_{x \rightarrow 0} e^x = e^0 = 1 \text{ и } \lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1) = 1 - 1 = 0 \right)$, то имеем неопределенность вида $\infty - \infty$. Сведем ее к неопределенности вида $\frac{0}{0}$, приводя дроби к общему знаменателю. Имеем:

Имеем:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1 - x)'}{(x(e^x - 1))'}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{1 \cdot (e^x - 1) + x e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{e^x - 1 + x e^x}, \text{ так как и здесь пределы}$$

числителя и знаменателя равны нулю, то опять имеем неопределенность вида $\frac{0}{0}$. Применив правило Лопиталя получим:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)'}{(e^x - 1 + xe^x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{e^x + e^x + xe^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{e^x(2+x)} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2+x} = \frac{1}{2}.$$

г) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\operatorname{tg} x}$, так как $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin x = 1$, а $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \operatorname{tg} x = \infty$, то

имеем неопределенность вида 1^∞ . Используя основное логарифмическое тождество, получим $(\sin x)^{\operatorname{tg} x} = e^{\ln(\sin x)^{\operatorname{tg} x}} = e^{\operatorname{tg} x \ln \sin x}$, значит

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\operatorname{tg} x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} e^{\operatorname{tg} x \ln \sin x} = e^{\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \operatorname{tg} x \ln \sin x}. \text{ Найдем предел показателя:}$$

$$\text{теля:} \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \operatorname{tg} x \ln \sin x = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \ln \sin x}{\cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin x \cdot \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin x}{\cos x} = 1 \cdot \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin x}{\cos x}, \text{ т.к.}$$

$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \ln \sin x = \ln 1 = 0$ и $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x = \cos \frac{\pi}{2} = 0$, то имеем неоп-

ределенность типа $\frac{0}{0}$ и, применяя правило Лопиталья, получим

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(\ln \sin x)'}{(\cos x)'} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{-\sin x} = \frac{0}{-1} = 0. \text{ Значит, в ответе имеем}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\operatorname{tg} x} = e^0 = 1.$$

Пример 4. Провести полное исследование функции и построить график этой функции $f(x) = \frac{x^2}{1-x}$.

Исследуем функцию согласно схеме:

1. Исследовать функцию алгебраическими методами: найти область определения функции исследовать функцию на четность и нечетность, исследовать функцию на периодичность.
2. Исследовать функцию с помощью пределов: найти точки разрыва функции и асимптоты графика функции.
3. Исследовать функцию по первой производной: найти интервалы монотонности и точки экстремума функции.
4. Исследовать функцию по второй производной: исследовать график функции на выпуклость и вогнутость и найти точки перегиба.
5. Если понадобится, то провести дополнительное исследование функции с помощью всех вышеперечисленных методов, например, найти точки пересечения графика функции с осями координат и интервалы знакопостоянства функции, найти угол наклона касательной к графику функции в некоторой точке, лежащей на графике этой функции, в частности в точке перегиба, если такая точка имеется на графике и т.д..
6. Построить график функции.

Решение.

1. Область определения функции $D_f = (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$.
2. Не периодична.

3. Так как $f(-x) = \frac{x^2}{1+x}$, то $f(-x) \neq f(x)$ и $f(-x) \neq -f(x)$, следовательно функция не является ни четной ни нечетной.

4. Точки пересечения графика с осями:

а) с Ox : $y=0$, т.е. $\frac{x^2}{1+x} = 0$, $x=0$.

б) с Oy : $x=0$, т.е. $y = \frac{0}{1-0} = 0$.

График пересекает оси в начале координат. Найдем интервалы знакопостоянства функции (т.е. интервалы, где она положительна и интервалы, где она отрицательна). $f(x) > 0$, при $\frac{x^2}{1-x} > 0$, т.е. при $1-x > 0$, $x < 1$. Итак, $f(x) > 0$ при $x \in (-\infty; 1)$; $f(x) < 0$ при $x \in (1; +\infty)$.

5. Точка разрыва: $x=1$.

Асимптоты: $x=1$ - вертикальная асимптота, так как

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2}{1-x} = \infty$. Найдем уравнение наклонной асимптоты:

$y = kx + b$. $k = -1$, т.к. $k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{(1-x)x} = -1$, и

$b = -1$, т.к. $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - kx) =$

$= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x^2}{1-x} + x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + x - x^2}{1-x} = -1$.

Таким образом, $y = -x - 1$ - наклонная асимптота графика.

$$6. f'(x) = \frac{2x(1-x) - x^2(-1)}{(1-x)^2} = \frac{2x - 2x^2 + x^2}{(1-x)^2} = \frac{2x - x^2}{(1-x)^2} = \frac{x(2-x)}{(1-x)^2},$$

$f'(x) = 0$ при $x=0$ и $x=2$ и не существует при $x=1$.

Итак, критические точки функции $x=0$, $x=2$, $x=1$. Изучим поведение функции в окрестности каждой критической точки. Результаты сведены в таблице.

Таблица.

x	$-\infty < x < 0$	0	$0 < x < 1$	1	$1 < x < 2$	2	$2 < x < +\infty$
$f'(x)$	-	0	+	не существует	+	0	-
$f(x)$	убывает	0 min	возрастает	не существует	возрастает	-4 max	убывает

В точке $x=1$ функция не имеет экстремума, так как она в ней не определена.

7. Исследуем функцию на выпуклость.

$$f''(x) = \frac{(2-2x)(1-x)^2 + 2(2x-x^2)(1-x)}{(1-x)^4} =$$

$$\frac{2-2x-2x+2x^2+4x-2x^2}{(1-x)^3} = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

$f''(x) > 0$ при $(1-x)^3 > 0$, т.е. при $1-x > 0$ или $x < 1$. $f''(x) > 0$ при $x \in (-\infty; 1)$ и на этом промежутке график имеет выпуклость вниз, а при $x \in (1; +\infty)$ - выпуклость вверх. Отметим это в таблице.

Таблица

x	$(-\infty; 1)$	1	$(1; +\infty)$
$f''(x)$	+	не определена	-

$f(x)$	выпуклость вниз		выпуклость вверх
--------	--------------------	--	---------------------

График функции не имеет точек перегиба.

8. На основании проведенного исследования строим график функции,

рис. 6.

Задачи для самостоятельной работы.

201-210. Для заданных функций найти

- а) первую производную y' и вторую производную y'' ;
- б), в) первую производную y' ;
- г) дифференциал dy .

201) а) $y = 3x^4 - \frac{5}{3x^3} - 1$; б) $y = (x^2 - 1) \ln 2x$;

в) $y = \frac{\cos x^2}{\sin 3x}$; г) $y = e^{\sin 5x}$

202) а) $y = 2x^5 - \frac{1}{3x^3} + 5$; б) $y = (x^3 + x - 1) \sin 4x$;

в) $y = \frac{2^x}{\sin^2 x}$; г) $y = \sin^4 x$.

203) а) $y = 4x^2 - \frac{5}{3x^6} + 1$; б) $y = (2x^2 - 7x) \cdot 10^{(1-x)}$;

в) $y = \frac{x}{\sin^2 x}$; г) $y = \operatorname{ctg}^2 x$.

204) а) $y = 3 - \frac{x^5}{6} + \frac{6}{x^5}$; б) $y = 3^{\sqrt{x}} \operatorname{tg} 7x$;

в) $y = \frac{\sin x^2}{x^3 - 1}$; г) $y = \sin^3 3x$.

205) а) $y = 2x^2 + \frac{3}{x^2} + 5$; б) $y = (1 - x^3) \operatorname{arctg} 6x$;

в) $y = \frac{\sin(1-x)}{x^2 + 6}$; г) $y = \operatorname{tg}^3(2x - 3)$.

206) а) $y = \frac{x^3}{3} + \frac{4}{x^4} + 5$; б) $y = (1 + \operatorname{arctg} 3x) e^x$;

в) $y = \frac{\cos(1-3x)}{x^2}$; г) $y = 6^{\sqrt{x}}$.

207) а) $y = \frac{x^7}{5} + \frac{3}{x^3} + 1$; б) $y = (1 - 2x + x^2) \operatorname{tg} 6x$;

в) $y = \frac{\sin(2-x)}{e^{3x}}$; г) $y = c \operatorname{tg}^2 2x$

208) а) $y = 1 - \frac{2}{x^6} - \frac{(x+1)^2}{3}$; б) $y = \sqrt{x} \cdot \arccos(1-x^2)$;

в) $y = \frac{3+2x}{\sin^4 x}$; г) $y = \cos^3 7x$.

209) а) $y = \frac{5x^3}{3} + \frac{6}{x} - 1$; б) $y = e^{\sqrt{x}}(1 - \operatorname{arctg} 8x)$;

в) $y = \frac{4-5x}{\cos^2 3x}$; г) $y = \ln^3 \sin x$.

210) а) $y = 1 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2x}$; б) $y = (\ln(3x^2 - 1)) \cdot \sin 2x$;

в) $y = \frac{2 - \sin x}{\sin e^x}$; г) $y = 3^{\operatorname{arctg} x}$.

211-220. Найти пределы с помощью правила Лопиталья

211) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin 3x}$; 212) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{1 - \cos 3x}$;

$$213) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}; \quad 214) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}; \quad 215) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x};$$

$$216) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\ln x}; \quad 217) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\operatorname{tg}^2 x};$$

$$218) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^4 x}{x^9}; \quad 219) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{e^x}; \quad 220) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^3}.$$

221-230. Провести полное исследование данной функции и построить ее график

$$221) y = \frac{x^3 + 4}{x^2}; \quad 222) y = \frac{x^2 + 1}{x};$$

$$223) y = \frac{2}{x^2 + 2x}; \quad 224) y = \frac{4x^2}{3 + x^2}$$

$$225) y = \frac{2x^2 - 3}{x^2}; \quad 226) y = \frac{x^2 - 3}{x};$$

$$227) y = \frac{4 - x^3}{x^2}; \quad 228) y = \frac{x^2 - 2}{x};$$

$$229) y = \frac{2x^3 + 1}{x^2}; \quad 230) y = \frac{(x-1)^2}{x^2}.$$